

# Ibuprofène BEKER

Ibuprofène  
Comprimé pelliculé 200 mg et 400 mg

## 1-FORME ET PRÉSENTATION:

Ibuprofène BEKER® 200 mg: Comprimé pelliculé. Boîte de 30 comprimés.  
Ibuprofène BEKER® 400 mg: Comprimé pelliculé. Boîte de 30 comprimés.

## 2-COMPOSITION:

Chaque comprimé pelliculé contient:  
Ibuprofène BEKER® 200 mg:  
Ibuprofène BEKER® 400 mg:  
Ibuprofène 200 mg  
Ibuprofène 400 mg

Excipients: Amidon de maïs, acide stéarique, silice colloïdale, glycérate d'ammonium sodique, silicate de magnésium, povidone, amidon de maïs polyglucosé.  
Agent de remplissage: Acétate de calcium.

Alcool polyvinylique, polyéthylène glycol, titane, dioxyde de titane, dioxyde de fer jaune, dioxyde de fer noir.

## 3-CLASSE THÉRAPEUTIQUE:

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien, il appartient à la classe des AUTRES ANALGÉSQUES ET ANTIPIÉRIQUES.

## 4-INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES:

4-1- **Arthrose**: Ibuprofène BEKER® 200 mg est indiqué, chez l'adulte et l'enfant de plus de 12 ans [voir encadré 6.4], dans le traitement de courte durée de la fièvre et/ou des douleurs telles que : maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, contusions et règles douloureuses.

4-2- **Ibuprofène BEKER® 400 mg** est indiqué, chez l'adulte et l'enfant de plus de 30 kg [voir encadré 11 à 12 ans], dans le traitement de courte durée de la fièvre et/ou des douleurs telles que : maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, contusions et règles douloureuses.  
Il est aussi indiqué chez l'adulte, après au moins un avis médical, dans le traitement de la crise de migraine légère à modérée, avec ou sans aura.

## 5-POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION:

**Posologie**  
Ibuprofène BEKER® 200 mg:  
ADAPTE À L'ADULTE ET À L'ENFANT À PARTIR DE 20 KG (enfant 6 ans).

Affections douloureuses et/ou liées  
Chez l'enfant, la posologie usuelle est de 20 à 30 mg/kg/jour en 3 prises par jour (sans dépasser 30 mg/kg/jour).  
Chez l'adulte, de 20 à 30 kg (enfant 6 à 11 ans) : 1 comprimé (200 mg), à renouveler si besoin au bout de 6 heures.

Il ne faut pas dépasser 3 comprimés par jour (600 mg).  
Chez l'adulte et l'enfant de plus de 30 kg (enfant 11-12 ans) : 200 mg à 400 mg, à renouveler si besoin au bout de 6 heures.  
Dans tous les cas, ne pas dépasser 1200 mg.

Il ne faut pas dépasser les doses recommandées ni la durée de traitement (3 jours en cas de fièvre, 5 jours en cas de douleur).  
Ibuprofène BEKER® 400 mg:

ADAPTE À L'ADULTE ET À L'ENFANT PESANT PLUS DE 30 KG (11-12 ans).  
Affections douloureuses et/ou liées

La posologie usuelle est de 1 comprimé à 400 mg par prise, à renouveler si nécessaire toutes les 6 à 8 heures, sans dépasser 3 comprimés à 400 mg par jour (1200 mg) par jour.

Il ne faut pas dépasser les doses recommandées ni la durée de traitement (3 jours en cas de fièvre, 5 jours en cas de douleur).  
La posologie maximale est de 200 comprimés par jour.

En cas de crise de migraine  
1 comprimé à 400 mg le plus tôt possible dès le début de la crise.  
La posologie maximale est de 200 comprimés par jour. La seconde dose ne doit pas être prise au cours de la même crise.

Toujours la crise peut être traitée avec un autre traitement qui ne soit pas un anti-inflammatoire non stéroïdien ni de l'aspirine.

Il ne faut dépasser une deuxième dose peut être prise à condition de respecter un intervalle de 8 heures entre les 2 prises.

## EN CAS DE DOUTE, IL FAUT CONSULTER LE MÉDECIN OU LE PHARMACIEN.

### Mode d'administration:

Voie orale.  
Avaler le comprimé, sans le mâcher, avec un grand verre d'eau.  
Les comprimés sont à prendre de préférence au cours d'un repas.

**Précautions d'administration:**  
Les prises systématiques permettent d'éviter les oscillations de douleur ou de fièvre.  
Elles doivent être espacées d'au moins 6 heures.

Elles doivent être espacées de 3 jours en cas de fièvre et de 5 jours en cas de douleur.  
Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, ou si elles s'aggravent ou en cas de survenue d'un autre trouble, en informer votre médecin.

## DANS TOUTS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DU MÉDECIN.

## 6-CONTRE-INDICATIONS:

Ne prenez jamais Ibuprofène BEKER® dans les cas suivants:  
- Au-delà de 5 mois de grossesse révisée (24 semaines d'aménorrhée).  
- Antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la prise de ce médicament ou d'un médicament apparenté, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, acide acétylsalicylique (aspirine).

- Antécédents d'allergie aux autres constituants du comprimé.  
- Antécédents de saignement gastro-intestinal ou de ulcère liés à des traitements antérieurs par AINS.  
- Ulcère ou saignement de l'estomac ou de l'intestin en évolution ou récidivant.

- Hémorragie gastro-intestinale, hémorragie cérébrale ou autre hémorragie en cours.  
- Maladie grave du rein.  
- Maladie grave des reins.  
- Maladie grave du cœur.  
- Lésion rétinienne diabétique.  
- Enfant de moins de 6 ans car il peut avaler des tracers et s'étouffer.

## EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## 7-MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:

Mises en garde spéciales:  
- Si vous êtes une femme, Ibuprofène BEKER® peut réduire votre fertilité. Si vous souhaitez être reconnue comme les femmes ou souhaitez concevoir un enfant, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme enceinte ou allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.  
- Si vous êtes une femme allaitante, consultez votre médecin.

Détenteur de la BI:

BEKER

LABORATOIRES

Chô-Avator, Dr. et Béatrice TIZET, Alger

laboratoire

Z.A. entassement D'I Boudia, cité Ferraï N'Sourmer

N°18 Dar el Boudia 16100, Alger

Date de dernière mise à jour: Décembre 2015

