

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 23/08/2012

Dénomination du médicament

**LOCOID 0,1%, crème
17-butyrate d'hydrocortisone**

Encadré

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que LOCOID 0,1%, crème et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser LOCOID 0,1%, crème ?
3. Comment utiliser LOCOID 0,1%, crème ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LOCOID 0,1%, crème ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE LOCOID 0,1%, crème ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique

Qu'est-ce que LOCOID ?

Ce médicament est un corticoïde (également appelé anti-inflammatoire stéroïdien) d'activité forte destiné à être appliqué sur la peau. Il agit sur les mécanismes de l'inflammation et réduit les phénomènes allergiques.

Indications thérapeutiques

Dans quels cas est-il utilisé ?

LOCOID est utilisé pour traiter certaines maladies de la peau comme l'eczéma de contact (allergie de la peau), la dermatite atopique (inflammation de la peau), le psoriasis (maladie au long cours avec notamment présence de plaques et/ou de lésions sur la peau), mais votre médecin peut également vous le prescrire dans d'autres situations.

LOCOID existe sous différentes formes adaptées à des situations spécifiques. La forme "crème" est particulièrement adaptée pour traiter des maladies de la peau appelées dermatoses aigües suintantes.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER LOCOID 0,1%, crème ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

N'utilisez jamais LOCOID :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (le 17-butyrate d'hydrocortisone) ou à l'un des autres composants contenus dans LOCOID. Vous trouverez la liste complète des composants à la rubrique 6 de cette notice.
- Si vous avez des plaies ouvertes sur la peau (lésions ulcérées).
- Si vous avez de l'acné.
- Si vous souffrez d'une affection de la peau appelée rosacée (sévère rougeur soudaine ou rougeur de la peau et du visage dite aussi couperose).
- Si vous souffrez d'une infection de la peau due : à un virus (bouton de fièvre, zona, varicelle...), à une bactérie (impétigo...), à des champignons microscopiques (pied d'athlète ou teigne) ou à un parasite (comme la galle).
- Si vous souffrez de tuberculose (infection des poumons) ou de syphilis (maladie sexuellement transmise).
- Si vous avez une dermatite péri orale (rougeur autour de la bouche).
- Si vous avez des démangeaisons de l'anus ou des organes génitaux (organes sexuels).

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec LOCOID :

- Si vous prenez d'autres médicaments qui contiennent des corticoïdes car vous pourriez avoir des effets indésirables.
- Eviter l'utilisation sur de larges surfaces de peau lésée, sous un pansement, bandage ou couche imperméable ou dans les plis (aine, sous les bras, sous les seins) ou sous les couches chez le nourrisson et l'enfant en bas âge car cela augmente l'absorption des corticoïdes.
- Eviter l'utilisation sur le visage ou les organes génitaux (sexuels) qui sont très sensibles aux corticoïdes.
- Il est préférable d'éviter d'utiliser LOCOID chez les nourrissons car il est possible que la substance active (l'hydrocortisone) passe dans le sang.
- Ce médicament contient certains composants dont vous devez tenir compte :
 - du parahydroxybenzoate qui peut provoquer des réactions allergiques.
 - de l'alcool cétostéarylique qui peut provoquer des réactions locales de la peau (par exemple : eczéma).
- Vous ne devez pas appliquer LOCOID sur les muqueuses (intérieur du nez, de la bouche, oreilles) et les paupières.

Pendant le traitement

Si vous avez une irritation ou une infection, vous pourriez avoir besoin d'arrêter ce traitement. Vous devez donc signaler à votre médecin si vous avez :

- une infection causée par un virus (comme un bouton de fièvre ou la varicelle),
- une infection causée par une bactérie,
- une infection causée par un parasite (comme la galle),
- une infection causée par un champignon (pied d'athlète ou teigne),
- la tuberculose ou la syphilis.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin ou de votre pharmacien. Si vous découvrez que vous êtes enceinte, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le traitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à effet notable

Informations importantes concernant certains composants de LOCOID01%, crème

LOCOID contient du parahydroxybenzoate et de l'alcool cétostéarylique (voir également le paragraphe "Faites attention avec LOCOID").

3. COMMENT UTILISER LOCOID 0,1%, crème ?

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

La dose habituelle est de 2 applications par jour.

Mode et voie d'administration

- Ce médicament doit être appliqué localement sur la peau en couches minces sur la zone à traiter, suivies d'un léger massage.
- Il est conseillé d'appliquer ce médicament en touches espacées, puis de l'étaler avec un gant en plastique jusqu'à ce qu'il soit entièrement absorbé.
- Après utilisation, lavez-vous bien les mains pour éviter tout contact avec le visage ou les yeux.
- N'appliquez LOCOID que sur des zones atteintes.

Si l'effet de LOCOID est trop faible

N'augmentez pas le nombre d'applications par jour sans demander l'avis de votre médecin.

Une augmentation du nombre d'applications quotidiennes risquerait d'aggraver les effets indésirables sans améliorer les effets thérapeutiques

Durée du traitement

Votre médecin vous indiquera pendant combien de temps vous devez utiliser ce médicament. Si aucune amélioration n'est constatée en fin de traitement, consultez votre médecin.

Dans certains cas l'arrêt du traitement doit être progressif. Il peut être obtenu en espaçant les applications et/ou en utilisant un médicament de la même famille (corticoïde) moins fort ou moins dosé.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de LOCOID que vous n'auriez dû :

Utilisez toujours LOCOID comme votre médecin vous l'a indiqué. L'utilisation excessive ou prolongée de corticoïdes locaux peut être à l'origine d'exacerbation des effets indésirables, et un passage systémique n'est pas exclu.

En cas de surdosage systémique, un traitement symptomatique approprié est indiqué.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Sans objet.

Risque de syndrome de sevrage

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**Description des effets indésirables**

Comme tous les médicaments, LOCOID est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Les effets indésirables suivants peuvent survenir :

- Développement exagéré des poils.
- Eclaircissement de la peau (dépigmentation).
- Infection.
- Réactions allergiques telles que des boutons de type acné, rougeurs ou démangeaisons (eczéma de contact, urticaire).

En cas d'utilisation prolongée, les effets indésirables suivants peuvent également survenir :

- Amincissement et fragilité de la peau.
- Apparition de petits vaisseaux sanguins en surface (à redouter particulièrement sur le visage).
- Vergetures.
- Pousse d'acné, rougeurs et irritations autour de la bouche.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER LOCOID 0,1%, crème ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption

Ne pas utiliser LOCOID après la date de péremption mentionnée sur la boîte après EXP. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Conditions de conservation

A conserver à une température ne dépassant pas +25°C. Ne pas mettre au réfrigérateur, ne pas congeler.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**Liste complète des substances actives et des excipients****Que contient LOCOID ?**

La substance active est : le 17-butyrate d'hydrocortisone microfine (0,100 gramme pour 100 grammes de crème).

Les autres composants sont : l'alcool benzylique, l'éther cétostéarylique de macrogol 25, la paraffine liquide légère, la vaseline, le parahydroxybenzoate de propyle, le parahydroxybenzoate de butyle, l'acide citrique anhydre, le citrate de sodium anhydre et l'eau purifiée.

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que LOCOID et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous la forme d'une crème contenue dans un tube de 15 g ou 30 grammes.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

Titulaire

ASTELLAS PHARMA
102-116, rue Victor Hugo
Immeuble Le Malesherbes
92300 Levallois Perret

Exploitant

ASTELLAS PHARMA
114, rue Victor Hugo
92300 LEVALLOIS PERRET

Fabricant

TEMMLER ITALIA S.R.L.
Via Delle Industrie, 2
20061 CARUGATE (MI)
ITALIE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Conformément à la réglementation en vigueur.

Date d'approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

Sans objet.