

Lanzomed® 30 mg

Lansoprazole

Microgranules gastrorésistants en gélule

Composition :

Lansoprazole 30 mg.

Excipient :

Saccharose, Glycolate d'amidon sodique, Amidon de maïs, Laurylsulfate de sodium, Povidone, Acide oléique, Hydroxyde de potassium, Hydroxyde d'ammonium, Hydroxy propyl methyl cellulose, triéthyl citrate, Dioxyde de titane, Talc, Acide méthacrylique. .

Excipients à effet notoire :

Saccharose, Sodium, Potassium.

Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un inhibiteur spécifique de la pompe à protons.

Il est préconisé dans les cas suivants :

-Le traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien associé ou non à une œsophagite.

-La prévention des rechutes des ulcères duodénaux.

-Le traitement préventif des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens chez les patients à risque.

Posologie et mode d'administration :

-Traitement du reflux gastro- œsophagien : 1 gélule par jour.

-Traitement d'entretien et prévention des récurrences des œsophagites par reflux gastro – œsophagien : 1 à 2 gélules par jour.

-Traitement d'entretien des ulcères duodénaux : 1 gélule par jour.

-Traitement préventif des lésions gastroduodénales induites par les anti- inflammatoires non stéroïdiens : 1 gélule par jour.

Contres indications :

Hypersensibilité au Lansoprazole.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Effets indésirables :

Lansoprazole est en général bien toléré, les effets secondaires rapportés sont : les nausées, les diarrhées, les coliques abdominales, les vertiges, les céphalées et plus rarement des éruptions cutanées.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Centre National de pharmacovigilance et de matériovigilance

-Site internet : www.cnpm.org.dz

-Adresse: CNPM, sis, route petit staouali (NIPA) dely Ibrahim –Alger 16320

-Tel/Fax: (213)23367502 / (213)23367527 / (213)23367529

-Email: cnpm@cnpm.org.dz

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

Mise en garde :

Comme les autres médicaments anti sécrétoires gastriques, Lansoprazole favorise le développement des bactéries intra gastrique par diminution du volume et de l'acidité du suc gastrique.

Une surveillance particulière devra être effectuée chez les patients recevant du diazépam, de la phénytoïne, des antivitamines K.

Utiliser ce médicament avec précaution chez l'enfant.

En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou de déficit en sucrase – isomaltase (maladies métaboliques rares).

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse et Allaitement :

Grossesse : chez la femme enceinte l'innocuité du Lansoprazole n'a pas été établie, par mesure de prudence, il est déconseillé de l'utiliser au cours du premier trimestre de la grossesse.

On s'abstiendra de le prescrire pendant les autres trimestres, sauf en cas de nécessité absolue.

Allaitement : en absence de données sur le passage dans le lait maternel, l'allaitement est déconseillé pendant la durée du traitement. EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Conditions de conservation :

A conserver à une température inférieure à 25 °C, à l'abri de l'humidité.

Présentation :

Boîte de 30 gélules contenant des microgranules gastrorésistants dans une boîte avec notice.

D.E .n° : 19/09/10 A 167/544

Liste II

Date de révision de la notice : Octobre 2018.

Détenteur de la D.E :

SARL World Medicine Limited,
Centre commercial et des affaires el Oods, niveau 11, BU ca 11-05 Chéragua- Alger

Fabricant et conditionneur:

SARL World Medicine Limited Z.I Oued Tlatat lot N° 06 Oran Algerie.



WORLD MEDICINE LIMITED

Pharmaceutical Company

لانسوبرازول

حبيبات دقيقة مقاومة لحموضة المعدة في كبسولة

هاتف / فاكس: 23367502 (213) / 23367527 (213) /
23367529 (213)

البريد الإلكتروني: dz.cnpm@cnpm.org

من خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية، يمكنكم المشاركة في توفير مزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

تحذير:

كباقي الأدوية الأخرى المضادة للإفراز المعدي، لانسوبرازول يساعد على تطور بكتيريا معدية داخلية وذلك بانخفاض حجم وحموضة عصارة المعدة. يجب أن تكون هناك مراقبة خاصة للمرضى المعالجين بالديازيبام، الفينيتوين، مضادات الفيتامين K. استخدم هذا الدواء بحذر عند الطفل.

بسبب وجود السكراروز يمنع استعمال هذا الدواء في حالة حساسية مفردة لسكر الفركتوز، في حالة مرض سوء امتصاص الغلوكوز أو سكر الألكاتوز أو ندرة انزيم السكرارز أيزوماتاز (أمراض الأيض النادرة).

لاجتنب أي تفاعل مع أدوية أخرى يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي بكل علاج يستعمل في نفس الوقت.

حالات الحمل والرضاعة:

الحمل: عند المرأة الحامل عدم الضرر بالانسوبرازول غير محدد. استعمال هذا الدواء خلال الفصل الأول من الحمل غير منصح به، من باب الحيطه.
نمتنع عن وصفه خلال الفصول الأخرى، إلا عند الضرورة المطلقة.
الرضاعة: لعدم وجود معلومات حول تسرب هذا الدواء في حليب الأم فالرضاعة غير منصح بها خلال فترة العلاج.

في حالة الشك لا تردد في طلب رأي الطبيب أو الصيدلي.

شروط الحفظ:

يحفظ في درجة حرارة أقل من 25°م، بعيدا عن الرطوبة.

العرض:

علبة 30 كبسولة تحتوي على حبيبات مقاومة لحموضة المعدة. معبأة في علبة مع نشرة.

رقم التسجيل: 19/09/10 A 167/544

القائمة II

تاريخ مراجعة النشرة: أكتوبر 2018.

صاحب مقر التسجيل:

ش د م وورلد ميدسين ليميتاد

مركز التجارة والأعمال القدس، مستوى 11، 05-Ca11 Bu، الشارقة - الجزائر

المصنع والمعبئ:

ش د م وورلد ميدسين ليميتاد المنطقة الصناعية رقم 06 واد تيليات وهران الجزائر.

التركيب

لانسوبرازول..... 30 ملغ.

السواغات:

سكاروز، غليكولات نشاء الصوديوم، نشاء الذرة، لوريل سولفات الصوديوم، بوفيدون، حمض الأوليك، هيدروكسيد البوتاسيوم، هيدروكسيد الامونيوم، هيدروكسي بروبيول ميتيل سيليلوز، ثلاثي إيثيل السيترات، ثنائي أكسيد التيتان، تالك، حمض الميتاكريليك.

سواغات ذات أثر معلوم: سكاروز، صوديوم، بوتاسيوم.

دواعي الاستعمال:

هذا الدواء هو مثبط خاص لمضخة البروتونات، يوصف في الحالات التالية:
-علاج أعراض الارتداد المعدي المريئي مع أو بدون التهاب المريء
-الوقاية من رداعات القرع العفجية
-علاج واق للجروح المعدية والعفجية الناتجة عن مضادات الالتهاب الغير سترودية عند المرضى المعنيين بالخطر.

كيفية ومقادير الاستعمال:

-علاج الارتداد المعدي المريئي: كبسولة في اليوم.
-علاج محافظ وواقي من رداعات التهابات المريء نتيجة الجزر المعدي المريئي: كبسولة إلى 2 في اليوم.
-علاج محافظ للقرع العفجية: كبسولة في اليوم.
-علاج واق للجروح المعدية والعفجية الناتجة عن مضادات الالتهاب الغير سترودية: كبسولة في اليوم.

موانع الاستعمال:

-حساسية مفردة اتجاه اللانسوبرازول.

في حالة الشك، من الواجب طلب رأي الطبيب أو الصيدلي.

الأعراض الجانبية:

بشكل عام تحمل لانسوبرازول حسن، الأعراض الجانبية التي ذكرت هي: غثيان، اسهال، آلام بطنية، دوام، آلام في الرأس ونادرا تفتح جلدي.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

إذا ظهرت عليك أي آثار جانبية، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني. ينطبق هذا أيضًا على أي آثار جانبية غير مذكورة في النشرة. يمكنك أيضا الإبلاغ عن الأعراض مباشرة عبر نظام الإبلاغ الوطني: المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي.

الموقع: www.cnpm.org.dz

-العنوان: المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي سطاوالي الصغرى معهد باستور دالي براهيم الجزائر 16320.



WORLD MEDICINE LIMITED

Pharmaceutical Company